

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA  
C.C.P. Montpellier 5238-57

**SPECIAL LUZERNE A GRAINES**

N° 1 - 19 février 1986

*J'ajoute à  
le Spécial Luzerne,*

## LUZERNE A GRAINES

(en collaboration avec la FNAMS  
et les SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

### DESHERBAGE DES JEUNES CULTURES :

- A FAIRE SYSTÉMATIQUEMENT
- APRÈS UN CHOIX JUDICIEUX DE LA PARCELLE

- \* Ne compromettez pas la quantité et la qualité des semences que vous allez récolter pendant 3 ou 4 ans.
- \* Evitez d'implanter la luzernière porte-graine dans des parcelles envahies de mauvaises herbes :
  - impossibles à détruire (sauf dans la rotation) : armoise, liseron, mélilot, sorgho d'Alep (sauf au stade rhizome).
  - ou dont la destruction coûte cher : rumex, cuscute, plantain, chiendent,...

### RAISONNEZ VOTRE DESHERBAGE

- 1 - Pour un semis en sol nu, au printemps : voir au verso
- 2 - Pour un semis sous couvert de Tournesol
  - benfluraline (Bonalan 7 l/ha) incorporée avant semis (vibroculteur 2 passages croisés)
  - néburon (Nombreuses spécialités) en prélevée
- 3 - Pour un semis sous couvert de céréales
  - la culture abri limite le salissement
  - mais celui-ci ne peut être bien contrôlé que par application de dinosèbe seul ou associé au 2,4 DB (HORCO L) en l'absence d'environnement viticole ou arboricole à moins de 500 m.)




MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON  
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal  
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42



DESHERBAGE DES JEUNES CULTURES DE LUZERNE EN SOL NU

Stade de la luzerne	PRODUITS COMMERCIAUX	Dose d'utilisation kg P.C./ha	Ray-Grass	Vulpin	Pâturin	Renouée des O.	Renoué P.	Renouée Liseron	Chénopode	Amarande	Véronique	Capselle	Sanve Moutarde	Rapistre	Laiteron	Matricaire	Séneçon	Helminthie	Morelle	REMARQUES
pré-semis incorporation	BONALAN (benfluraline)	7																		
	*CAPSOLANE (EPTC)	8	?	?	?															Efficace sur Mercuriale Mourron, Diplotaxis
pré-levée	GRANUREX (néburon)	4																		Efficacité conditionnée par humidité du sol
2 à 4 feuilles trifol.	Traiter impérativement le soir à t°C fraîche dinosèbe (nombreuses spéc.)	3 à 4																		traiter entre 10° et 25° au sol Légèrement agressif
IMPOSSIBILITÉ D'EMPLOI DANS UN ENVIRONNEMENT VITICOLE (500 M.)																				
3 à 4 feuilles trifoliées	*HERBO GIL (dinoterb) +EMBUTONE +GRANUREX	2,5 + 3 + 2																		Mettre 5 l. d'EMBUTONE pour Rapistre, Matricaire et Séneçon
	*LENTAGRAN +EMBUTONE +GRANUREX	1 + 5 + 2																		Légèrement agressif
	*HORCO L (dinosèbe + 2,4DB)	6																		Traiter entre 12° et 25° légèrement agressif
	*BASAGRAN (bentazone) EMBUTONE	1,5 +																		Légèrement agressif sur la luzerne. Intéressant sur Matricaire jeune
Tous stades	FERVINAL FERVIN ou FUSILADE	2,5 1 à 1,5 1 à 2																		solution de rattrapage + huile

\* les produits ou mélanges précédés du signe "\*" ne sont pas homologués sur la Luzerne. Utilisation sous la responsabilité de l'agriculteur

Efficacité :  très bonne  bonne  moyenne à insuffisante  mauvaise  
 pas de référence

résultats non exhaustifs, extraits du dépliant FNAMS-ITCF-GNIS, concluant des travaux d'expérimentation